

23. Αποκατάσταση λόγου και ομιλίας με τη μέθοδο “Phoneme Touch & Say” σε ασθενείς μετά από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

Μπεντεβή Π.¹, Γυφτογιάννη Μ.², Γυφτογιάννη Α.², Γαλάτα Α.³

¹ Λογοθεραπεύτρια, «ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ» Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας, Τρίπολη

² Λογοθεραπεύτρια, Εταιρία Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου Αιτωλοακαρνανίας-

ΕΨΥΠΕΑ, Μεσολόγγι, ³ Φυσίατρος, «ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ» Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας, Τρίπολη

Εισαγωγή: Ένα ποσοστό ασθενών (μέχρι 30%) μετά από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) μπορεί να εμφανίσει ποικίλης σοβαρότητας διαταραχές στην επικοινωνία, την ομιλία και το λόγο του.

Σκοπός: Η ανάδειξη της αποτελεσματικότητας της μεθόδου “Phoneme Touch & Say” σε ασθενείς μετά από ΑΕΕ για την αποκατάσταση του λόγου και της ομιλίας τους.

Υλικό: Μελετήθηκαν 4 ασθενείς (3 άνδρες, 1 γυναίκα), με μέσο όρο ηλικίας 67 έτη, οι οποίοι παρουσίαζαν αφασία Broca και η ομιλία τους δεν ήταν πλήρως καταληπτή μετά από ΑΕΕ. Εμφάνιζαν δυσκολίες στις αυτοματοποιημένες αλληλουχίες, την επανάληψη λέξεων και φράσεων και την κατονομασία.

Μέθοδος: Παρακολούθησαν ατομικές συνεδρίες από δύο έως τέσσερις φορές εβδομαδιαίως. Κατά την αρχική τους αξιολόγηση εκτιμήθηκε ο αυθόρμητος λόγος και εφαρμόστηκε η Διαγνωστική Εξέταση της Βοστώνης για την Αφασία. Η παρέμβαση στηρίχτηκε στη χρήση της μεθόδου “Phoneme Touch & Say” για την επανάληψη μεμονωμένων λέξεων και φράσεων και την παραγωγή αυτοματοποιημένων αλληλουχιών.

Αποτελέσματα: Με τη χρήση της συγκεκριμένης μεθόδου οι ασθενείς μπορούν να παράγουν καταληπτά λέξεις και φράσεις και να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη επιτυχία στις δοκιμασίες που είχαν υποβληθεί πριν την έναρξη της θεραπείας.

Συμπεράσματα: Η χρήση αυτής της μεθόδου μπορεί να είναι αποτελεσματική στην αποκατάσταση του λόγου και της ομιλίας ασθενών μετά από ΑΕΕ και να συμβάλλει στη βελτίωση της λειτουργικότητάς τους.